

## آنتروتوکسمی (پرخوری یا قلوه نرمی)

آنتروتوکسمی (پرخوری یا قلوه نرمی)

### علت

- یک بیماری کلستریدیل است که بیشتر بره هایی را که از علوفه تازه و شاداب میچرند تحت تأثیر قرار می دهد، اما می تواند در تمام سنین در گوسفندانی که به شدت از غلات تغذیه می کنند، اتفاق بیوفتد.
- بیشتر موارد آنتروتوکسمی در گله هایی با عدم برنامه مناسب واکسیناسیون اتفاق می افتد.

### علائم

- بیشتر گوسفندان دارای آنتروتوکسمی متاسفانه تلف می شوند، زیرا بیماری خیلی سریع ایجاد می شود و چند ساعت پس از مشاهده علائم اولیه، مرگ رخ می دهد.
- علائم اولیه آنتروتوکسمی، کسلی و به دنبال آن پایین آمدن سر گوسفندان همراه با تشنج و کف دهان و سپس مرگ است.
- گوسفندان بالغ بیشتر از حیوانات جوان دوام می آورند، اما بیش از ۲۴ ساعت زنده نمی مانند.

### تشخیص

- تشخیص موقت، مبتنی بر سابقه مرگ ناگهانی در حالی که رژیم پر خطر برای دامها استفاده کرده اید، است.
- برای تأیید آنتروتوکسمی نیاز به آزمایش آزمایشگاهی نمونه های پس از مرگ شامل بخش هایی از روده ، کلیه ها ، مغز و ادرار است.
- پس از مرگ، کلیه ها ممکن است به سرعت تجزیه شوند.

### درمان

- هیچ درمان موثری برای آنتروتوکسمی وجود ندارد.

### پیشگیری

- واکسیناسیون کلید پیشگیری از آنتروتوکسمی است.
- از تغییر ناگهانی رژیم غذایی، مانند مقادیر زیاد غلات، اجتناب کنید.